

ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE MAMMOTOMII

Imię i nazwisko Pacjenta.....PESEL.....

Cel zabiegu

Diagnostyczny: polega na pobraniu wycinków podejrzanej tkanki z gruczołu piersiowego i poddanie szczegółowemu badaniu histopatologicznemu

Lecznicy: polega na usuwaniu małych zmian w całości wraz z marginesem.

Wskazania do zabiegu

Biopsję mammotomiczną pod kontrolą USG wykonuje się w przypadku:

1. Uwidocznienia (w mammografii lub USG) bardzo małych, podejrzanych zmian, nieprzekraczających 1 cm i niewyczuwalnych podczas badania palpacyjnego.
2. Zmian łagodnych - BI-RADS 2, czyli nawracającej torbieli objawowej
- gruczolakowłóknika < 2 cm u kobiet < 30 r.ż. (przy kancerofobii, planowaniu ciąży),
- gruczolakowłóknika < 2 cm u kobiet > 30 r.ż. (zawsze, chyba że jest stacjonarne)
3. Zmian podejrzanych - BI-RADS 4 (średnie prawdopodobieństwo złośliwości wynosi od 3-do 94%). Zmiana do 2 cm w tym także (poszerzony przewód z podejrzeniem brodawczaka, torbiel z podejrzanym rozrostem),

Przygotowanie do zabiegu

Pacjentka nie wymaga szczególnego przygotowania, musi natomiast przekazać informacje dotyczące stanu zdrowia, a szczególnie:

- poinformować o zaburzeniach krzepnięcia krwi i o zażywaniu leków przeciwkrzepliwych,
- poinformować o uczuleniach na środki farmaceutyczne czy znieczulające,
- poinformować o tendencjach do nadmiernego gojenia ran (tzw. keloid),
- poinformować o tendencjach do omdleń lub dużych zmian ciśnienia krwi,
- poinformować o występującej cukrzycy,
- poinformować o zapaleniu wątroby lub zakażeniu wirusem HIV,
- poinformować o ciąży.

Przebieg zabiegu

Po dezynfekcji miejsca wkłucia i miejscowym znieczuleniu zostaje wprowadzona do zmiany igła biopsyjna mammotomiczna. Następnie połączony z igłą mammotom uruchamia mechanizm rotacyjny znajdujący się wewnątrz igły i system próżniowy, który wciąga fragment zmiany do wewnątrz wycięcia igły, pobierając zmienioną tkankę i odprowadza ją na zewnątrz go do specjalnego pojemnika. Uzyskany materiał biopsyjny jest przekazywany do badania histopatologicznego. Lekarz badający obraca igłę biopsyjną w nowe położenie i dokonuje nowego pobrania tkanki. W ten sposób można pobrać tkankę z dowolnego miejsca wokół igły biopsyjnej bez konieczności ponownego nakłuwania piersi. Biopsja mammotomiczna, nie trwa zwykle dłużej niż 20-30 minut.

--- GRUPA MEDYCZNA TOMMED ---

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwy rzeczowo podmiot Grupy Medycznej Tommed, do której należą: <https://tommed.pl/adresy>
Obowiązek informacyjny spełniony został za pośrednictwem strony internetowej administratora w zakładce RODO.

Druk nr 2015 wersja nr 3

Postępowanie po zabiegu

1. Po zabiegu zakłada się plaster i opatrunek uciskowy, który usuwa się po pierwszej dobie
2. Przez 3 nie należy myć rany mydłem
3. Po badaniu wskazany jest obcisły biustonosz
4. W kolejnych 3 dniach należy unikać dużego wysiłku fizycznego
5. Nie uprawiać sportu np. gra w tenisa, nie korzystać z saun
6. Do 2 godzin po badaniu nie prowadzić samochodu ani nie obsługiwać urządzeń niebezpiecznych

Możliwe powikłania

Powikłania zdarzają się bardzo rzadko

1. Ból miejscowy ,
2. Krwiak w okolicy zabiegu,
3. Krwawienie późne,
4. Niezmiernie rzadko pojawiają się obfite krwawienia wymagające interwencji chirurgicznej,
5. Zaburzenia gojenia, infekcje, nadmierne gojenie (tzw. keloid) w miejscu wkłucia,
6. Zaburzenia ze strony układu krążenia (omdlenie), po zastosowanym znieczuleniu,
7. Reakcje alergiczne jak też zaburzenia układu sercowo-naczyniowego spowodowane anestetykiem lokalnym,
8. Możliwość uszkodzenia implantu.

Oświadczam, że zapoznałam się z podanymi informacjami i wyjaśnieniami Lekarza oraz miałem/am możliwość zadawania pytań.

Zrozumiałam wszystkie wiadomości i **wyrażam świadomą zgodę** na zabieg mammotomii.

DATA I PODPIS PACJENTA I/LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO	DATA I PODPIS LEKARZA
 	