

ŚWIADOMA ZGODA NA BIOPSJĘ GRUBOIGŁOWĄ

Imię i nazwisko Pacjenta.....PESEL.....

Opis badania: wykonywana w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG, pozwalająca uzyskać materiał do pełnego badania histopatologicznego. Biopsja gruboigłowa wykonywana jest w przypadku guzów piersi, tarczycy, węzłów chłonnych i zmian podskórnych o charakterze guza. Do tego celu stosuje się różne typy igieł biopsyjnych o średnicy powyżej 1,2 mm, niektóre wyposażone są w przyrządy (strzykawka automatyczna) umożliwiające wykonanie nakłucia przy pomocy jednej ręki. Mimo, że do badania można znieczulić skórę to jednak zabieg może być nieprzyjemny.

Cel biopsji gruboigłowej: Biopsja gruboigłowa jest wykonywana w celu pobrania takiej ilości materiału tkankowego z guza, aby możliwe było postawienie ostatecznego rozpoznania histopatologicznego, czyli rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących natury guza.

Przygotowanie: Zabieg ma charakter mało inwazyjny, wykonywany jest w warunkach sali zabiegowej. Pacjent nie musi być na czczo. Ważne jest aby odstawić przed zabiegiem leki przeciwkrzepliwe po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie. Jeżeli pacjent uczulony jest na środki znieczulające, musi ten fakt zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie.

Sposób wykonania badania: biopsję gruboigłową wykonuje się najczęściej pod kontrolą ultrasonografu (rzadziej mammografu). Do badania należy rozebrać się do pasa, a następnie ułożyć na wznak na kozetce. Po dezynfekcji skóry, pod kontrolą ultrasonografu wprowadza się za pomocą cienkiej igły podskórnie i wokół guza środek znieczulający. Następnie wykonuje się niewielkie nacięcie skóry, które ułatwia wprowadzenie igły biopsyjnej. Całość badania jest niebolesna, najbardziej nieprzyjemnym momentem jest podanie znieczulenia. Sam zabieg polega na wprowadzeniu igły o średnicy 2,1 mm, która dzięki mechanizmowi spustowemu załączonego urządzenia (nazwanego „pistoletem biopsyjnym”) w ułamku sekundy pobiera waleczek tkanki z guza.

Powikłania: najczęstszym powikłaniem jest krwiak, który czasem może być dość rozległy, jednak po leczeniu zachowawczym znika w zależności od rozległości w okresie od tygodnia do miesiąca. Możliwość uszkodzenia implantu. Bardzo rzadko zdarza się stan zapalny po biopsji. Jest absolutnie błędnym stwierdzenie, jakoby biopsja mogła przyspieszyć rozwój choroby nowotworowej.

Metody alternatywne: Biopsja otwarta i mammotomiczna. Jednak biopsja gruboigłowa jest mniej inwazyjna.

PYTANIA lub NIE MAM PYTAŃ

OŚWIADCZENIE PACJENTA: Oświadczam, że zrozumiałam/em wszystkie podane informacje oraz miałem/am możliwość zadawania pytań.

Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie zabiegu: **biopsja gruboigłowa.**

DATA I PODPIS PACJENTA I/LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO	DATA I PODPIS LEKARZA
.....	